DESIGNED FOR Independent RETAILERS

ORTHO®

# DISEASE B GON™

## COPPER FUNGICIDE

CONCENTRATE FUNGICIDA DE COBRE

## CONTROLS POWDERY MILDEW, BLACK SPOT & RUST!

For Roses, Fruits & Vegetables

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**CAUTION** See back panel booklet for additional precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCION** Vea los avisos de precaución adicionales en la parte posterior de la bolsa.

| Active Ingredient: | |
|---|---|
| Copper Octanoate (Copper Soap) .. | 10.0% |
| Inert Ingredients..... | 90.0% |
| Total ..... | 100.00% |
| Metallic copper equivalent..... | 1.8% |

LE271401000

NET CONTENTS/Contenido Neto
16 FL OZ (1 PT) 473 mL



EPA Reg 67702-2-239 (16floz)
Ortho Disease B Gon Copper Fungicide Concentrate

**Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

## PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|---|---|
| **Si el producto entra en los ojos:** | • Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.<br>• Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.<br>• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. |
| **Si entra en contacto con la piel o la ropa:** | • Quítese la ropa contaminada.<br>• Lave inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 a 20 minutos.<br>• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. |
| **En caso de ingerir el producto:** | • Consulte a un médico o a un centro de control de envenenamientos inmediatamente para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.<br>• Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua.<br>• No induzca el vómito a menos que así se lo indique un médico o un centro de control de envenenamientos.<br>• No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento. |
| **En caso de inhalar el producto:** | • Traslade a la persona a un lugar con aire fresco.<br>• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego proporcione respiración artificial, boca a boca, de ser posible.<br>• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener más recomendaciones sobre el tratamiento. |

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.



## AVISOS DE PRECAUCION

**RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS:**

**Precaución:** Nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite inhalar el vapor del rociado. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

## RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para peces y organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes de tormenta, cunetas de drenaje, canaletas o aguas superficiales. Aplicar el producto en tiempo calmo cuando no se ha pronosticado lluvia para las 24 horas siguientes ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que se escurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

**LA GARANTIA ORTHO®**

Si por algún motivo no está satisfecho con este producto, envíenos por correo el comprobante de compra para obtener un reembolso total del precio de compra.



ORTHO®

# DISEASE B GON™

## COPPER FUNGICIDE

**CONCENTRATE**

**FOR A WIDE RANGE OF PLANT DISEASES: POWDERY MILDEW, RUSTS, BLACKSPOT, LEAF & FRUIT SPOT, DOWNY MILDEW, FRUIT ROT, LATE BLIGHT.**

**Dormant and Growing Season Liquid Copper Fungicide**

OPEN
Resealable Label for Directions & Precautions

**ORTHO & YOUR ENVIRONMENT**

Your home and yard are places for family and pets to enjoy. That's why Ortho® Products are designed with care to provide effective solutions to problems inside and outside your home. For best results please follow instructions for appropriate usage, storage and disposal.

**Questions, Comments or Medical Information**
***Preguntas, comentarios o información médica***
**Call 1-877-332-0748** **www.ortho.com**

F.P.O.
80%

0 71549 16009 8

© 2010 The ORTHO Group.
World rights reserved.

Manufactured for
**The Ortho Group**
P.O. Box 190, Marysville, OH 43040

EPA Reg. No. 67702-2-239
EPA Est. 239-1A-3[I], 58996-MO-1[A], 08562-OH-1[W], 84064-IA-001[P]
Superscript is first letter of lot number.
Made in USA LB271201000

## DIRECTIONS FOR USE

- It is a violation of Federal Law to use **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** in any manner inconsistent with its labeling.
- **READ AND FOLLOW ALL APPLICABLE DIRECTIONS AND PRECAUTIONS ON THIS LABEL BEFORE USING.**

## APPLICATION DIRECTIONS

Shake well before use. Most conventional liquid pesticide plant sprayers can be used to apply **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** to plants.

To control **powdery mildew,** use a solution of 0.5 to 2.0 fluid ounces of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** in a gallon of water. For best control, start spraying before the disease is visible or when mildew is first visible on the plant. Spray all plant parts thoroughly, and repeat every 7 to 10 days. On plants that are very susceptible to powdery mildew, such as greenhouse grown cucumber, it is best to spray the plants twice a week during the first 2 weeks after emergence, and weekly thereafter. On outdoor plants, re-apply after rain.

To control **downy mildew, leaf and fruit spots, blights and rust,** use a solution of 0.5 to 2.0 fluid ounces of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** in a gallon of water. Ensure that all surfaces of the plant are thoroughly sprayed. For best control, begin treatment 2 weeks before disease normally appears or when weather forcasts predict a long period of wet weather. Alternatively, begin treatment when disease first appears, and repeat at 7 to 10 day intervals for as long as needed. Re-apply after rain. Use 2 fluid ounces per gallon of water, sprayed every 7 days or less, following heavy rain or when the amount of disease is increasing rapidly. This higher rate should be used for preventing late blight on potato and related plants. If possible, time applications so that at least 12 hours of dry weather follow application.

To prevent **fruit rots**, use a solution of 0.5 to 2.0 fluid ounces of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** in a gallon of water. Ensure that all surfaces of the plant are thoroughly sprayed. Apply at the start of flowering and continue every 7 to 10 days until harvest. Fungicidal sprays are especially warranted when weather forecasts predict a long period of wet weather. Re-apply after rain.





EPA Reg 67702-2-239 (16floz)
Ortho Disease B Gon Copper Fungicide Concentrate

## DIRECTIONS FOR USE ON ORNAMENTALS AND TURF DISEASES CONTROLLED, LISTED BY PLANT

| Ornamental Plant | Common Name | Disease Controlled |
|---|---|---|
| *Aechmea faciaa* | Urn plant, bromeliad | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot and blight |
| *Aeschynanthus pulcher* | Lipstick vine | Botrytis blight, Leaf spot (fungal) |
| *Aglaonema* species | Chinese evergreen | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight, Soft rot |
| *Anthurium* species | Tailflower | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight, Soft rot |
| *Aphelandra squarrosa* | Zebra plant | Botrytis blight, Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight |
| *Araucaria heterophylla* | Norfolk Island pine | Colletotrichum needle blight |
| *Asplenium nidus* | Bird's nest fern | Bacterial leaf spot and blight |
| *Brassaia actinophylla* | Schefflera | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) Rhizoctonia blight |



| | | |
|---|---|---|
| *Caladium* species | Caladium | Bacterial leaf spot and blight, Rhizoctonia blight |
| *Calathea* species | Rattlesnake plant | Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) |
| *Caryota mitis* | Fishtail palm | Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) |
| *Chamaedorea* species | various palms | Leaf spot |
| *Chrysalidocarpus lutescens* | Areca palm | Leaf spot |
| *Cissus* species | Grape ivy | Anthracnose leaf and fruit spot, Botrytis blight, Downy mildew, Powdery mildew, Rhizoctonia blight |
| *Codiaeum variegatum* | Croton | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot and blight |
| *Cordyline terminalis* | Ti plant | Anthracnose leaf and fruit spot, Leaf spot (fungal) |
| *Chryptanthus* species | Bromeliad, earthstar | Anthracnose leaf and fruit spot |
| *Dieffenbachia* species | Dieffenbachia | Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) Rhizoctonia blight |
| *Dracaena* species | Dracaena, Corn plant | Bacterial leaf spot and blight, Botrytis blight, Leaf spot (fungal) |



| | | |
|---|---|---|
| | Fusariosis, manchas de hollín, mancha de mosca (manchas foliares y de fruta) | Trate hasta la caída de las flores. Usar después de la caída de las flores provocará decoloración. |
| Frutas pequeñas (Mora silvestre, arándano, frambuesa, fresa) | Moho gris (Botritis), pudrición por mucor, pudrición de la fruta por Rhizopus | Aplique al comienzo de la floración y continúe cada 7 a 10 días hasta la cosecha. |
| Árboles de frutas con pepitas (Almendra, chabacano, cereza, nectarina, durazno, ciruela) | Chancro por bacterias (Pseudomonas syringae), Podredumbre morena y enfermedad en los pétalos, manchas foliares y de las frutas, manchas foliares por bacteria | Para el chancro por bacterias, aplique como rocío latente mientras los capullos crecen, repitiendo en la etapa de apertura del capullo y semanalmente después de eso, según sea necesario, hasta un máximo de seis rociadas. En el otoño vuelva a rociar a 10 y 80% de la caída de las hojas. Para la podredumbre morena y enfermedad en los pétalos, aplique cubriendo completamente con el rocío en las etapas de latencia retrasada (crecimiento del capullo), estado "popcorn", floración completa y caída de los pétalos. Durante el clima húmedo se podrían requerir rociadas adicionales a los pétalos. |
| | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Añublo de la hoja del durazno y corineo | Aplique como rocío latente a finales del otoño durante un periodo de clima seco. |



| | | |
|---|---|---|
| Fresa | Manchas foliares angulares, quemaduras foliares, manchas foliares por Mycosphaerella, añublo foliar por Phomopsis, mildiú polvoroso, manchas foliares por septoria | Rocíe un mes después de plantar (o antes de la floración en plantas establecidas) y dos veces más en intervalos de 7 a 10 días. |
| | Podredumbre de la fruta por antracnosis, moho gris (Botritis) | Aplique al comienzo de la floración y continúe cada 7 a 10 días hasta la cosecha. |
| Tabaco | Moho azul (mildiú velloso) | |
| Tomate, papa, berenjena, pimiento | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, manchas por bacterias, puntos por bacterias, manchas foliares por cercospora, añublo temprano, moho gris, añublo tardío, moho foliar, Manchas foliares por septoria | |
| Nueces | Añublo | |

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Almacene este producto en su envase original y manténgalo en un área de almacenamiento segura, fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Almacene en un lugar seguro, alejado del fuego abierto o llamas. Mantenga el recipiente cerrado y vuelva a sellarlo después de usarlo. El producto puede dañarse si se congela. No almacene el producto a una temperatura inferior a 4°C. En caso de derrame, use materiales absorbentes y deséchelo siguiendo procedimientos aprobados.

**ELIMINACION DEL PESTICIDA:**

Envase no rellenable. No utilice nuevamente el envase. **Si está vacío:** Colóquelo en la basura o recíclelo, si corresponde.

| | | |
|---|---|---|
| *Syngonium podophyllium* | Nephthytis | Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight |
| *Yucca* species | yucca | Leaf spot (fungal) |

The ornamental and turf species listed may be treated with **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate**. Unless otherwise stated, mix 0.5 to 2 fluid ounces in one gallon of water and spray all plant surfaces thoroughly. When necessary, repeat sprays every 7 to 10 days. **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** may cause some copper toxicity on some plant species. Before spraying a specific plant species, consult your State Experiment Station or make a test spray.

## DIRECTIONS FOR USE ON ORNAMENTALS AND TURF

| Crop | Disease Controlled | Application Notes |
|---|---|---|
| Pine | Needle blight | Mix at a rate of 0.5 to 2.0 fluid ounces of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** with one gallon water.<br>Spray until needles are thoroughly wet with spray.<br>Apply when new needles are just emerging. |
| Rose and Ornamental Shrubs (Such as; Crape Myrtle, Forsythia, Hydrangea, Willow, Mock-Orange, Deutzia, Pyracantha, Japanese quince, Abelia, Summersweet) | Blackspot, Downy mildew, Gray mold (Botrytis), Leafspots, Powdery mildew, Rust | **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** may cause copper toxicity on some rose varieties. Copper toxicity appears as purple spots. For Black spot, mix at a rate of 1.44 fl. ozs. of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** per gallon of water. For Powdery Mildew, mix at a rate of 1.08 fl. ozs. of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** per gallon of water. In damp cool conditions (below 60°F), phytotoxicity is likely to occur with the use of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate**. |
| Sycamore | Anthracnose leaf spot | Make first application just before buds begin to swell, and repeat twice, at 7-day intervals. |
| Turf | Ascochyta leaf blight, Cercospora leaf spots, Dollar spot | Mix 1.5 to 6 fluid ounces with 2.5 gallons of water and apply to 1,000 sq. ft. For best control, begin treatment 2 weeks before disease normally appears. Alternatively, begin treatment when disease first appears, and repeat at 7 to 10 day intervals for as long as needed. To reduce Ascochyta leaf blight mow less frequently, only as necessary to maintain recommended height. Water before noon to allow grass to dry. Water thoroughly only as required to avoid moisture stress. Apply **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** when disease first appears, and repeat at 7 to 10 day intervals for as long as needed. In frequently diseased areas, prune adjacent trees and shrubs to reduce turf shading and to improve air movement. |
| Turf (continued) | Rust | To reduce rust mow frequently to reduce rust spore production. Water and fertilize lawn as required to avoid moisture and nutrient stress. Water before noon to allow grass to dry. Apply **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** when disease first appears, and repeat at 7 to 10 day intervals for as long as needed. In frequently diseased areas, prune adjacent trees and shrubs to reduce turf shading and to improve air movement. |

| Cosecha | Enfermedad controlada | Notas sobre la aplicación |
|---|---|---|
| Frijoles, chícharos | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Añublo foliar y manchas en las vainas por ascochita, añublos bacteriales (halo, manchas comunes y cafés), mildiú velloso, moho gris (botritis), mildiú polvoroso, moho blanco (Sclerotinia) | |
| Betabel, acelga, espinaca | Manchas foliares por cercospora, mildiú velloso, roya blanca, mildiú polvoroso | |
| Zanahorias | Añublo foliar por alternaria, añublo foliar por bacterias, añublo foliar por cercospora | |
| Apio y apio nabo | Manchas foliares por bacterias, añublo (temprano) por cercospora, añublo (tardío) por septoria | |
| Cítricos (toronja, limón, lima, naranja, pomelo, mandarina) | Mancha melanosa, mancha grasosa, fusariosis de los cítricos, mancha parda por alternaria, alga roja (Florida) | Aplicar de 1 a 3 semanas después de la caída de los pétalos. Repetir cada 2 semanas si es necesario hasta que la fruta tenga 7.6 cm de diámetro. No mezcle este producto con aceote cuando lo aplique sobre cítricos. |
| Maíz | Añublo foliar del sur, Manchas foliares por cercospora | |
| Cosechas crucíferas (Brócoli, col de bruselas, canola, coliflor, repollo, col rizada, colirrábano, mostaza, Pak-Choi, rábano, colinabos, nabo) | Añublo por alternaria, manchas foliares por bacterias, mildiú velloso, mildiú polvoroso, moho blanco (Sclerotinia) | |
| Cucurbitáceas (pepinos, melón, zapallo, calabaza, zapallito) | Añublo por alternaria, manchas foliares angulares, manchas foliares y de las frutas por antracnosis, mildiú velloso, moho gris, fusariosis, manchas foliares por ulocladium, mildiú polvoroso | Para pepinos que se cultiven en un invernadero, aplicar este producto 2 veces por semana durante las primeras 2 semanas después de la aparición, seguido por rociadas cada 7 días. |
| Grosellas y Grosella espinosa | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Phyllosticta, manchas foliares por Septoria, mildiú polvoroso | |
| Ginseng | Añublo por alternaria, añublo por botritis, Phytophthora, mildiú polvoroso | |

| | | |
|---|---|---|
| Uvas | Mildiú velloso, podredumbre negra, Manchas foliares y en la caña por Phomopsis, mildiú polvoroso, moho gris (botritis) | No mezcle este producto con cal. Ciertas variedades de Vinífera e híbridos franceses pueden ser sensibles a las rociadas con cobre lo cual dará como resultado quemaduras marginales en las hojas. Antes de rociar estas variedades, consulte con su Estación experimental estatal o haga pruebas de rociado. |
| Lúpulo | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Manchas foliares por cercospora, mildiú velloso, mildiú polvoroso | |
| Lechuga, Achicoria, Endivias | Mildiú velloso, manchas foliares por septoria, mildiú polvoroso, podredumbre húmeda por bacterias y podredumbre apical | Use la concentración más baja cuando la presión de la enfermedad sea baja o en variedades sensibles al cobre como la lechuga. |
| Cebolla, ajo, poro, chalote, cebollín | Añublo por botritis, mildiú velloso, podredumbre del cuello, podredumbre húmeda por bacterias | |
| Perejil | Quemaduras foliares, manchas foliares | |
| Cacahuates | Añublo por Sclerotinia, manchas foliares (tempranas y tardías), manchas por telaraña | |



| | | |
|---|---|---|
| Árboles de frutas carnosas (manzana, pera, membrillo) | NOTA: Cuando este producto se use según esta recomendación puede causar suberosis (russeting) variedades susceptibles de manzanas Golden Delicious y similares. Podría ocurrir una leve decoloración de otras variedades. Se debe usar de preferencia en variedades que no den frutos o que serán procesadas cuando la suberosis no sea una preocupación. En las manzanas no se debe exceder la concentración de 29.5 ml de este producto por 3.8 litros de agua. | |
| | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis | Aplique a mediados de julio. |
| | roya del cedro de manzana, roya del membrillo | La enfermedad también se puede reducir al retirar las plantas de cedro rojo del este cercanas (Juniperus virginiana L.). En juníperos, la roya del cedro de manzana se puede controlar al rociar las plantas al menos 4 veces entre los últimos días de agosto y los últimos días de octubre. |
| | Añublo de fuego | Rocíe en las puntas plateadas y en el desborre y repita en intervalos de 3 a 5 días según sea necesario, hasta la caída de los pétalos. Use la concentración más baja cuando la presión de la enfermedad sea baja y la concentración más alta cuando las condiciones favorezcan una presión elevada de la enfermedad. |



| | | |
|---|---|---|
| *Epipremnum aureum* | Pothos, Devil's ivy | Bacterial leaf spot and blight, Rhizoctonia blight |
| *Euphorbia milii* | Euphorbia | Rhizoctonia blight |
| *Fatsia japonica* | Japanese fatsia | Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) Rhizoctonia blight |
| *Ficus benjamina* | Weeping fig | Leaf spot (fungal) |
| *Ficus elastica* | India-rubber tree | Leaf spot (fungal), Botrytis blight |
| *Fittonia verschaffeltii* | Nerve plant | Rhizoctonia blight |
| *Hedra helix* | English ivy | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot and blight, Botrytis blight, Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight |
| *Hoya carnosa* | Wax plant | Botrytis blight, Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight |
| *Maranta leuconeura* | Prayer plant | Leaf spot (fungal) |
| *Monstera deliciosa* | Swiss cheese plant | Bacterial leaf spot and blight, Anthracnose leaf and fruit spot, Rhizoctonia blight, Soft rot |
| *Nephrolepis exaltata* | Boston fern | Bacterial leaf spot and blight, Botrytis blight, Rhizoctonia blight |
| *Peperomia* species | Peperomia | Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight |



| | | |
|---|---|---|
| *Philodendron* species | Philodendron | Anthracnose leaf and fruit spot, Botrytis blight, Leaf spot (fungal) |
| *Pilea* species | Aluminum plant | Bacterial leaf spot and blight, Anthracnose leaf and fruit spot, Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight |
| *Platycerium bifurcatum* | Staghorn fern | Bacterial leaf spot and blight, Rhizoctonia blight |
| *Polyscias* species | Aralia | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) |
| *Rhapis* species | Ladyfinger palm | Leaf spot (fungal) |
| *Rhoeo spathacea* | Oyster plant | Leaf spot (fungal) |
| *Saintpaulia ionantha* | African violet | Bacterial leaf spot and blight, Botrytis blight, Leaf spot (fungal), Powdery mildew |
| *Sansevieria triafasciata* | Snake plant | Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) |
| *Schefflera arboricola* | Dwarf Schefflera | Bacterial leaf spot and blight, Leaf spot (fungal) |
| *Schlumbergera* species | Cactus | Leaf spot (fungal) |
| *Sedum* species | Sedum | Leaf spot (fungal) |
| *Spathiphyllum* species | Spathe flower | Leaf spot (fungal), Rhizoctonia blight |

| | | |
|---|---|---|
| Césped | Añublos foliares por ascochita, Manchas foliares por cercospora, Mancha en rueda | Mezcle de 44.5 a 177 ml con 9.5 litros de agua y aplique a 93 metros cuadrados. Para un mejor control, comience el tratamiento 2 semanas antes del inicio habitual de la enfermedad. O bien, comience el tratamiento cuando la enfermedad aparezca por primera vez y repita la aplicación a intervalos de 7 a 10 días durante el tiempo que sea necesario.<br>Para reducir el añublo foliar por ascochita reduzca la frecuencia de la poda, sólo según sea necesario para mantener la altura recomendada. Riegue antes del mediodía para permitir que el pasto se seque. Riegue abundantemente sólo cuando sea necesario para evitar problemas de humedad. Aplique este producto cuando la enfermedad aparezca por primera vez y repita a intervalos de 7 a 10 días durante el tiempo que sea necesario. En áreas con enfermedades frecuentes, pode los árboles y los arbustos adyacentes para reducir la sombra sobre el césped y para mejorar la circulación del aire. |



| | | |
|---|---|---|
| Césped (continuación) | Roya | Para reducir la roya, pode con frecuencia con el fin de reducir la producción de esporas de roya. Riegue y fertilice el césped según sea necesario para evitar problemas de humedad y de nutrientes. Riegue antes del mediodía para permitir que el pasto se seque. Aplique este producto cuando la enfermedad aparezca por primera vez y repita a intervalos de 7 a 10 días durante el tiempo que sea necesario. En áreas con enfermedades frecuentes, pode los árboles y los arbustos adyacentes para reducir la sombra sobre el césped y para mejorar la circulación del aire. |

## MODO DE EMPLEO EN FRUTAS Y VEGETALES

A menos que se indique de otra forma más abajo, mezcle de 15 a 59 ml de este producto en 3.8 litros de agua. Use suficiente agua para garantizar una buena cobertura. Para un mejor control, comience el tratamiento 2 semanas antes del inicio habitual de la enfermedad o cuando el pronóstico anuncie un período de clima húmedo prolongado. O bien, comience el tratamiento cuando la enfermedad aparezca por primera vez y repita la aplicación en intervalos de 7 a 10 días durante el tiempo que sea necesario. Use la concentración más alta, aplicándola cada 7 días o menos, después de una lluvia fuerte o cuando la cantidad de la enfermedad aumente con rapidez. Si es posible, programe las aplicaciones de manera que haya 12 horas de clima seco después de la aplicación.



## DIRECTIONS FOR USE ON FRUITS AND VEGETABLES

Unless otherwise stated below, mix 0.5 to 2.0 fluid ounces of **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** with 1 gallon of water. Use sufficient water to ensure good coverage. For best control, begin treatment 2 weeks before disease normally appears or when weather forecasts predict a long period of wet weather. Alternatively, begin treatment when disease first appears and repeat at 7 to 10 day intervals for as long as needed. Use the higher rate, applied every 7 days or less, following heavy rain or when the amount disease is increasing rapidly. If possible, time applications so that 12 hours of dry weather follow application.

| Crop | Disease Controlled | Application Notes |
|---|---|---|
| Bean, Pea | Anthracnose leaf and fruit spot, Ascochyta leaf and pod spot, Bacterial blights (halo, common and brown spot), Downy mildew, Gray mold (Botrytis), Powdery mildew, White mold (Sclerotinia) | |
| Beet, Chard, Spinach | Cercospora leaf spot, Downy mildew, White rust, Powdery Mildew | |
| Carrots | Alternaria leaf blight, Bacterial leaf blight, Cercospora leaf blight | |
| Celery and Celeriac | Bacterial leaf spot, Cercospora (early) blight, Septoria (late) blight | |



| | | |
|---|---|---|
| Citrus (Grapefruit, Lemon, Lime, Orange, Pummelo, Tangerine) | Melanose spot, greasy spot, citrus scab, Alternaria brown spot, Red alga (Florida) | Apply 1-3 weeks after petal fall.<br>Repeat every 2 weeks if necessary until the fruit is 3 inches in diameter. Do not mix **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** with oil when applied on any citrus. |
| Corn | Southern leaf blight, Cercospora leaf spot | |
| Crucifer Crops (Broccoli, Brussels sprouts, Canola, Cauliflower, Cabbage, Kale, Kohlrabi, Mustard, Pak-Choi, Rape, Rutabaga, Turnip) | Alternaria blight, Bacterial leaf spot, Downy mildew, Powdery mildew, White mold (Sclerotinia) | |
| Cucurbits (Cucumbers, Cantaloupe, Squash, Pumpkin, Zucchini) | Alternaria blight, Angular leaf spot, Anthracnose leaf and fruit spot, Downy mildew, Gray mold, Scab, Ulocladium leaf spot, Powdery mildew | For cucumbers grown in a greenhouse, apply **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** 2 times per week in the first 2 weeks after emergence, followed by sprays every 7 days. |
| Currant and Gooseberry | Anthracnose leaf and fruit spot, Phyllosticta, Septoria leaf spots, Powdery mildew | |

| | | |
|---|---|---|
| Ginseng | Alternaria blight, Botrytis blight, Phytophthora, Powdery mildew | |
| Grapes | Downy mildew, Black rot, Phomopsis Cane and Leaf Spot, Powdery mildew, Gray mold (Botrytis) | Do not mix **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** with lime. Certain Vinifera and French Hybrid varieties may be sensitive to copper sprays resulting in marginal leaf burn. Before spraying these varieties, consult your State Experiment Station or make test sprays. |
| Hop | Anthracnose leaf and fruit spot, Cercospora leaf spot, Downy mildew, Powdery mildew | |
| Lettuce, Chicory, Endive | Downy mildew, Septoria leaf spot, Powdery mildew, Bacterial soft rot and bottom rot | Use lower rate when disease pressure is low or on copper sensitive varieties of lettuce. |
| Onion, Garlic, Leek, shallot, Chives | Botrytis leaf blight, Downy mildew, Neck rot, Bacterial soft rot | |
| Parsley | Leaf scorch, Leaf spot | |
| Peanuts | Sclerotinia blight, Leaf spots (early and late), web blotch | |



| | | |
|---|---|---|
| Pome Fruit Trees (Apple, Pear, Quince) | NOTICE: **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** as used in this recommendation may cause russeting of Golden Delicious and similar susceptible apple varieties. Mild russeting of other varieties may occur. Preferred use is on non-bearing or processing varieties where russeting is not a concern. On apple do not exceed the rate of 1.0 fluid ounces **ORTHO® Disease B Gon™ Copper Fungicide Concentrate** per gallon water. | |
| | Anthracnose leaf and fruit spot | Apply in mid-July. |
| | Cedar Apple Rust, Quince Rust | The disease can also be reduced by removing nearby eastern red cedar plants (Juniperus virginiana L.). On juniper, cedar apple rust can be controlled by spraying plants at least 4 times between late August and late October. |
| | Fireblight | Spray at silver tip and bud break and repeat on 3 to 5 day intervals as needed, up to petal fall. Use the lower rate if disease pressure is light and higher rate when conditions favor heavy disease pressure. |
| | Scab, Sooty Blotch, Flyspeck (fruit and leaf spots) | Treat up to blossom drop. Use after blossom drop will cause russeting. |



| | | |
|---|---|---|
| *Schefflera arboricola* | Cheflera enana | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Schlumbergera* | Cacto | Manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Sedum* | Sedo | Manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Spathiphyllum* | Cuna de Moisés | Manchas foliares (fúngicas), añublo por rizoctonia |
| *Syngonium podophyllium* | Singonio | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas), añublo por rizoctonia |
| especies de *Yucca* | Yuca | Manchas foliares (fúngicas) |

Las especies ornamentales y de césped listadas pueden ser tratadas con este producto. A menos que se indique de otra forma, mezcle de 15 a 59 ml en 3.8 litros de agua y rocíe todas las partes de la planta abundantemente. Cuando sea necesario, vuelva a rociar cada 7 a 10 días. Este producto puede causar intoxicación con cobre en algunas especies de plantas. Antes de rociar sobre una especie de planta específica, consulte con su Estación experimental estatal o haga una prueba de rociado.

**MODO DE EMPLEO EN PLANTAS ORNAMENTALES Y CESPED**

| Cosecha | Enfermedad controlada | Notas sobre la aplicación |
|---|---|---|
| Pino | Añublo de aguja | Mezcle de 15 a 59 ml de este producto con 3.8 litros de agua. Rocíe hasta que las agujas estén mojadas abundantemente. Aplique cuando las agujas nuevas comiencen a salir. |



| | | |
|---|---|---|
| Rosas y plantas ornamentales Arbustos (como mirto, forsitia, hortensia, sauce, jeringuillas, celinda de espigas, piracanto, membrillo japonés, abelia, zapotillo) | Mancha negra, mildiú velloso, moho gris (botritis), manchas foliares, mildiú polvoroso, roya | Este producto puede causar intoxicación con cobre en algunas variedades de rosas. La intoxicación con cobre aparece como manchas color púrpura. Para manchas negras, mezcle una cantidad de 42.5 ml de este producto con 3.8 litros de agua. Para mildiú polvoroso, mezcle 32 ml de este producto con 3.8 litros de agua. En condiciones húmedas y frescas (debajo de los 15°C), es probable que ocurra fitotoxicidad con el uso de este producto. |
| Sicomoro | Manchas foliares por antracnosis | Haga la primera aplicación justo antes de que los capullos comiencen a crecer, y repita dos veces, en intervalos de 7 días. |

| | | |
|---|---|---|
| especies de *Dieffenbachia* | Diefembaquia | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) añublo por rizoctonia |
| especies de *Dracaena* | Dracaena, planta del maíz | Manchas foliares y añublo por bacterias, añublo por botritis, manchas foliares (fúngicas) |
| *Epipremnum aureum* | Potos, hiedra del diablo | Manchas foliares y añublo por bacterias, Añublo por rizoctonia |
| *Euphorbia milii* | Euforbia | Añublo por rizoctonia |
| *Fatsia japonica* | Higo llorón | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) añublo por rizoctonia |
| *Ficus benjamina* | Ficus Benjamina | Manchas foliares (fúngicas) |
| *Ficus elástica* | Palo de goma | Manchas foliares (fúngicas), añublo por botritis |
| *Fittonia verschaffeltii* | Planta nervio | Añublo por rizoctonia |
| *Hedra helix* | Hiedra inglesa | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, manchas foliares y añublo por botritis, añublo por bortitris, manchas foliares (fúngicas), añublo por rizoctonia |
| *Hoya carnosa* | Flor de cera (Hoya carnosa) | Añublo por botritis, manchas foliares (fúngicas) Añublo por rizoctonia |
| *Maranta leuconeura* | Planta rezadora | Manchas foliares (fúngicas) |
| *Monstera deliciosa* | Planta de queso suizo | Manchas foliares y añublo por bacterias, Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Añublo por rizoctonia, podredumbre húmeda |



| | | |
|---|---|---|
| *Nephrolepis exaltata* | Helecho Boston | Manchas foliares y añublo por bacterias, añublo por botritis, añublo por rizoctonia |
| especies de *Peperomia* | Peperomia | Manchas foliares (fúngicas), añublo por rizoctonia |
| especies de *Philodendron* | Filodendro | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Añublo por botritis, manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Pilea* | Planta de aluminio | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares y de las frutas por antracnosis, manchas foliares (fúngicas), añublo por rizoctonia |
| *Platycerium bifurcatum* | Helecho Staghorn | Manchas foliares y añublo por bacterias, Añublo por rizoctonia |
| especies de *Polyscias* | Aralia | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Rhapis* | Palma bambú | Manchas foliares (fúngicas) |
| *Rhoeo spathacea* | Planta almeja | Manchas foliares (fúngicas) |
| *Saintpaulia ionantha* | Violeta africana | Manchas foliares y añublo por bacterias, añublo por botritis, manchas foliares (fúngicas), mildiú polvoroso |
| *Sansevieria triafasciata* | Espada de San Jorge | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) |



| | | |
|---|---|---|
| Small Fruits (Blackberry, Blueberry, Raspberry, Strawberry) | Gray mold (Botrytis), Mucor fruit rot, Rhizopus fruit rot | Apply at the start of flowering and continue every 7 to 10 days until harvest. |
| Stone Fruit Trees (Almond, Apricot, Cherry, Nectarine, Peach, Plum) | Bacterial canker (Pseudomonas syringae), Brown rot blossom blight, leaf and fruit spot, Bacterial leaf spot | For bacterial canker, apply as a dormant spray as buds begin to swell, repeating at the bud burst stage, and weekly thereafter as needed, up to six sprays. In the fall spray again at 10 and 80% leaf fall. For brown rot blossom blight apply full cover spray at delayed dormant (bud swell), popcorn, full bloom and petal fall stages. During wet weather additional bloom sprays may be necessary. |
| | Anthracnose leaf and fruit spot, Coryneum blight, Peach leaf curl | Apply as a dormant spray in late fall during a period of dry weather. |
| Strawberry | Angular leaf spot, Leaf scorch, Mycosphaerella leaf spot, Phomopsis leaf blight, Powdery mildew, Septoria leaf spots | Spray 1 month after planting (or before flowering on established plants) and twice more at 7 to 10 day intervals. |
| | Anthracnose fruit rot, Gray mold (Botrytis) | Apply at the start of flowering and continue every 7 to 10 days until harvest. |



| | | |
|---|---|---|
| Tobacco | Blue Mold (Downy Mildew) | |
| Tomato, Potato, Eggplant, Pepper | Anthracnose leaf and fruit spot, Bacterial speck, Bacterial spot, Cercospora leaf spot, Early blight, Gray mold, Late blight, Leaf mold, Septoria leaf spot | |
| Walnuts | Blight | |

## STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a secure place, away from open fire or flame. Keep container closed and reseal after use. Product may be damaged by freezing. Do not store product below 40°F (4°C). If spilled, use absorbent materials and dispose of in an approved manner.

**PESTICIDE DISPOSAL:**
Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.
**If empty:** Place in trash or offer for recycling if available.
**If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## FIRST AID

| | |
|---|---|
| **If in eyes:** | • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.<br>• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.<br>• Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| **If on skin or clothing:** | • Take off contaminated clothing.<br>• Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.<br>• Call a poison control center or doctor for treatment advice. |

| | |
|---|---|
| **If swallowed:** | • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.<br>• Have person sip a glass of water if able to swallow.<br>• Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.<br>• Do not give anything by mouth to an unconscious person. |
| **If inhaled:** | • Move person to fresh air.<br>• If person is not breathing call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.<br>• Call a poison control center or doctor for further treatment advice. |

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

**HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS**

**Caution:** Harmful if swallowed, absorbed through skin or inhaled. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Avoid breathing spray mist. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

## ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product may be toxic to fish and aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

**The ORTHO Guarantee®**

If for any reason you are not satisfied with this product, mail us proof of purchase to obtain a full refund of your purchase price.



**ORTHO® Disease B Gon™ Fungicida de cobre Concentrado** Para utilizar en rosas, frutas y vegetales. ¡Controla mildiú polvoroso, mancha negra y roya!

**ORTHO Y SU ENTORNO:** Su hogar y jardín son lugares en los que su familia y sus mascotas disfrutan. Por este motivo, los productos Ortho® están diseñados especialmente para proporcionar soluciones efectivas a los problemas dentro y fuera de su hogar. Para obtener mejores resultados, siga las instrucciones de uso, almacenamiento y eliminación apropiados.

## MODO DE EMPLEO

- Se considera una violación a la ley federal usar **ORTHO® Disease B Gon™ Fungicida de cobre Concentrado** de una manera diferente a la indicada en la etiqueta.
- **ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES INCLUIDAS EN ESTA ETIQUETA.**

## INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION

Agitar bien antes de usar. La mayoría de los rociadores convencionales de líquidos pesticidas se pueden emplear para aplicar **ORTHO® Disease B Gon™ Fungicida de cobre** a las plantas.

Para controlar el **mildiú polvoroso**, use una solución de 15 a 59 ml de **ORTHO® Disease B Gon™ Fungicida de cobre** en 3.8 litros (1 galón) de agua. Para obtener un mayor control, comience a rociar antes de que la enfermedad sea visible o cuando el mildiú polvoroso comience a ser visible en la planta. Rocíe abundantemente todas las partes de la planta y repita constantemente con 7 a 10 días de diferencia. En las plantas que son muy sensibles al mildiú polvoroso, como el pepino cultivado en invernaderos domésticos, es mejor rociar las plantas dos veces por semana durante las 2 primeras semanas después de la aparición y una vez por semana de allí en adelante. En las plantas exteriores, repita la aplicación después de la lluvia.

Para controlar el **mildiú velloso, las manchas foliares y de las frutas, añublos y roya,** use una solución de 15 a 59 ml de **ORTHO® Disease B Gon™ Fungicida de cobre** en 3.8 litros de agua. Asegúrese de que todas las superficies de la planta sean rociadas abundantemente. Para un mejor control, comience el tratamiento 2 semanas antes del inicio habitual de la enfermedad o cuando el pronóstico anuncie un período de clima húmedo prolongado. O bien, comience el tratamiento cuando la enfermedad aparezca por primera vez y repita la aplicación en intervalos de 7 a 10 días durante el tiempo que sea necesario. Repita la aplicación después de la lluvia. Use 59 ml por cada 3.8 litros de agua, y rocíe cada 7 días o menos, después de una lluvia fuerte o cuando la cantidad de la enfermedad aumente rápidamente. Este índice más alto se debe usar para evitar el añublo tardío en papas y en otras plantas relacionadas. Si es posible, programe las aplicaciones de manera que haya al menos 12 horas de clima seco después de la aplicación.



Para prevenir que se **pudran las frutas**, use una solución de 15 a 59 ml de **ORTHO® Disease B Gon™ Fungicida de cobre** en 3.8 litros de agua. Asegúrese de que todas las superficies de la planta sean rociadas abundantemente. Aplique al comienzo de la floración y continúe con la aplicación cada 7 a 10 días hasta la cosecha. Recomendamos especialmente rociar con fungicidas cuando haya pronósticos de períodos de clima húmedo prolongados. Repita la aplicación después de la lluvia.

## MODO DE EMPLEO EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE PLANTAS ORNAMENTALES Y CESPED, LISTADAS POR PLANTA

| Plantas ornamentales | Nombre común | Enfermedad controlada |
|---|---|---|
| *Aechmea faciaa* | Planta urna, bromelia | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Manchas foliares y añublo por bacterias |
| *Aeschynanthus pulcher* | Planta barra de labios | Añublo por botritis, manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Aglaonema* | Siempreverde china | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas), añublos por rizoctonia, podredumbre húmeda |
| especies de *Anthurium* | Flor de flamenco | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas), añublos por rizoctonia, podredumbre húmeda |
| *Aphelandra squarrosa* | Planta cebra | Añublo por botritis, manchas foliares (fúngicas) Añublo por rizoctonia |
| *Araucaria heterophylla* | Pino de la isla Norfolk | Añublo de aguja por Colletotrichum |
| *Asplenium nidus* | Helecho Nido de ave | Manchas foliares y añublo por bacterias |
| *Brassaia actinophylla* | Cheflera | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) añublo por rizoctonia |
| especies de *Caladium* | Caladio | Manchas foliares y añublo por bacterias, Añublo por rizoctonia |
| especies de *Calathea* | Planta cola de rata | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) |
| *Caryota mitis* | Palma cola de pescado | Manchas foliares y añublo por bacterias, manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Chamaedorea* | varias palmas | Manchas foliares |
| *Chrysalidocarpus lutescens* | Palma areca | Manchas foliares |
| especies de *Cissus* | Hiedra de la viña | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Añublo por botritis, mildiu velloso, Mildiú polvoroso, añublo por rizoctonia |
| *Codiaeum variegatum* | Crotón | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, Manchas foliares y añublo por bacterias |
| *Cordyline terminalis* | Planta Ti (Cordyline fruticosa) | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis, manchas foliares (fúngicas) |
| especies de *Chryptanthus* | Bromelia, estrella de tierra | Manchas foliares y de las frutas por antracnosis |

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

Caution: Harmful if swallowed, absorbed through skin or inhaled. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Avoid breathing spray mist. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

## ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product may be toxic to fish and aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

## FIRST AID

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person. **IF INHALED:** Move person to fresh air. • If person is not breathing call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

**Questions, Comments or Medical Information**
***Preguntas, comentarios o información médica***
**call 1-877-332-0748** **www.ortho.com**

Manufactured for
**The Ortho Group**
P.O. Box 190,
Marysville, OH 43040

© 2010 The ORTHO Group. World rights reserved.

NEUDORFF
Manufactured under license of
W. Neudorff GmbH KG

EPA Reg. No. 67702-2-239
EPA Est. 239-1A-3$^{I}$,
58996-MO-1$^{A}$,08562-OH-1$^{W}$,
84064-IA-001$^{P}$
Superscript is first letter of lot number.
**Made in USA**
LB271201000